

### Protocolo CHOP Madison-Wisconsin 25 semanas

Semana	Fármaco	Peso/ $m^2$	Dosis total	Notas	Fecha
1	Vincristina 0.7mg/ $m^2$ Continuar con Prednisolona 0.4 ml/24h	$m^2$	mg		7/1/14
2	Ciclofosfamide 200mg/ $m^2$ IV/PO Prednisolona 0.25ml/24h			Una gragea de 50mg por boca	14/1/14
3	Vincristina 0.5-0.7mg/ $m^2$ Prednisolona 0.25ml/48h de continuo				
4	Doxorubicina 1mg/kg IV				
6	Vincristina 0.7mg/ $m^2$			EVALUAR RESPUESTA DE LA MASA BAJO SEDACIÓN	
7	Ciclofosfamida 200mg/ $m^2$ IV/PO				
8	Vincristine 0.7mg/ $m^2$				
9	Doxorubicin 1mg/kg IV				
11	Vincristina 0.7mg/ $m^2$				

13	Ciclofosfamida 200mg/m <sup>2</sup> PO				
15	Vincristina 0.7mg/m <sup>2</sup>				
17	Doxorrubicina 1mg/kg IV				
19	Vincristina 0.7mg/m <sup>2</sup>				
21	Ciclofosfamida 200mg/m <sup>2</sup> PO				
23	Vincristina 0.7mg/m <sup>2</sup>				
25	Doxorrubicina 1mg/kg IV				

INSTITUTO VETERINARIO DE ONCOLOGIA COMPARADA

- Realizar un hemograma antes de cada administración.
- Se evaluara los valores renales y urianalisis (densidad y ratio pp/crea) cada vez que se administre doxorubicina
- El tratamiento con corticoides se continuara durante todo el tratamiento.
- Después de la ultima dosis, si el paciente se encuentra en remisión, continuar con revisiones cada mes-dos meses donde se evaluará el tamaño de la masa.